

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๐.๖/ว๑๖๗๙

ถึง สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง



มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นครราชสีมา
 380
 วันที่ 19 ม.ค. 2566
 เวลา

คณะกรรมการ
 รับเลขที่ 199
 วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖
 เวลา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือ หรือทางเว็บไซต์ <http://shorturl.asia/i38ae> เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านต่อไป

ทั้งนี้รายละเอียดสามารถ download file ได้จาก www.ops.go.th หัวข้อประกาศ : หนังสือเวียนหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดและโรงเรียนสาธิตทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เรียน อธิการบดี

- ๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
 - ๒) เห็นควรมอบ - ทุกส่วนงาน
- วชิรา

อ.กฤษณ์ ๒๕๖๖
 19 ม.ค. 2566

(นางสาวสุดใจ สุขคง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 19 ม.ค. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



นางนงนิตย์

นงนิตย์ กฤษณะวงษ์
 19 ม.ค. ๖๖

(ผศ.ดร. วิชิต สุขทร)
 รองอธิการบดี

๒๕ ม.ค. ๖๖

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรมอบ.....

สำนักงานปลัดกระทรวง
 กองกลาง กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
 โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๘๘
 โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔-๒๖

W
 (นางสาววิจิตรา ขุนไชยการ)
 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖

๒๓ ม.ค. ๖๖
 ๒๓/๑/๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง)
 คณบดีคณะครุศาสตร์

ด่วนที่สุด
 ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว.๕๙



กระทรวงสาธารณสุข
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 ของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่อในวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชากรทุกคน เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโควิด 19 โดยเร่งรัดและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึง แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่าอัตราการเข้ารับวัคซีนที่มีความจำเป็นตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนกลับมาเกิดการระบาดใหญ่ได้อีกครั้ง เช่น โรคหัด หัดเยอรมัน โปลิโอ คอตีบ ไอกรน ทำให้เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยงที่จะป่วยและมีอาการรุนแรง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บริการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กสำหรับสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการสร้างความเชื่อมั่น และเชิญชวนให้เกิดการตระหนักรู้ของประชาชนและการพาบุตรหลานเข้ารับบริการวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครบถ้วนตามเกณฑ์นำไปสู่การเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของประชากรในประเทศไทย ให้เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนต่อไป นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๖ ให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและความครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย เห็นควรขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. วีดิทัศน์เชิญชวนผู้ปกครองพาเด็ก มาฉีดวัคซีน

๒. โปสเตอร์กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๖

โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือ หรือทางเว็บไซต์ <https://shorturl.asia/138ae> เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๖ ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
 ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข




สื่อประชาสัมพันธ์

<input checked="" type="checkbox"/> กอก.	<input type="checkbox"/> กคอ.
<input type="checkbox"/> กกม.	<input type="checkbox"/> กกย.
<input type="checkbox"/> กกต.	<input type="checkbox"/> กข.
<input type="checkbox"/> กชค.	<input type="checkbox"/> กตค.
<input type="checkbox"/> กกรช.	<input type="checkbox"/> กสป.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

กรมควบคุมโรค
 กองโรคติดต่อทั่วไป
 โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๗
 โทรสาร -

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566



กำหนดการให้วัคซีนในเด็ก

อายุ	วัคซีนที่ให้	หมายเหตุ
แรกเกิด	HB1 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี	ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง หลังคลอด
	BCG วัคซีนป้องกันวัณโรค	ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
1 เดือน	HB2 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี	เฉพาะรายที่คลอดระหว่างกลางถึงเป็นภาคแรกของวีรสลับอีกเสบบี
2 เดือน	DTP-HB-Hib1 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ-ตับอักเสบบี-ฮิบ	ห้ามให้วัคซีนโรคคอตีบครั้งที่ 1 ในเด็กที่อายุมากกว่า 15 สัปดาห์
	OPV1 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	
	Rota1 วัคซีนโรตา	
4 เดือน	DTP-HB-Hib2 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ-ตับอักเสบบี-ฮิบ	ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน 1 ครั้ง
	OPV2 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	ห้ามให้วัคซีนโรคคอตีบครั้งสุดท้าย ในเด็กที่อายุมากกว่า 32 สัปดาห์
	IPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด	
	Rota2 วัคซีนโรตา	
6 เดือน	DTP-HB-Hib3 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ-ตับอักเสบบี-ฮิบ	ห้ามให้วัคซีนโรคคอตีบครั้งสุดท้าย ในเด็กที่อายุมากกว่า 32 สัปดาห์
	OPV3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	ให้ออกเว้นการได้รับวัคซีนโรคคอตีบครั้งที่ 3 ในเด็กที่ได้รับวัคซีน Rotarix มาแล้ว 2 ครั้ง
	Rota3 วัคซีนโรตา	
9 เดือน	MMR1 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน	
1 ปี	LAJE1 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	
1 ปี 6 เดือน	DTP4 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ	
	OPV4 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	
	MMR2 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน	
2 ปี 6 เดือน	LAJE2 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	
4 ปี	DTP5 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ	
	OPV5 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	
ประถมศึกษาปีที่ 1	MMR วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน	ตรวจสอบประวัติและให้วัคซีนเฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
	HB วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี	
	LAJE วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	
	IPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด	
	DT วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก	
	OPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	
	BCG วัคซีนป้องกันวัณโรค	ให้ในกรณีที่ไม่มีความทราบเคยได้รับ เมื่อแรกเกิดและไม่มีผลเป็น ไม่ให้ฉีดติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของโรคเอดส์
ประถมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนหญิง)	HPV1 และ HPV2 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี	จ่ายระหว่างระหว่างเข็ม ทางศูนย์อนามัย 0 เดือน กรณีศึกษาหญิงไม่มีได้อยู่ในระบบการศึกษาให้ฉีดอายุ 11-12 ปี
ประถมศึกษาปีที่ 6	DT วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก	



กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า

ครั้งที่	ช่วงอายุ 1-6 ปี		ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป		ข้อแนะนำ
	เดือนที่	วัคซีน	เดือนที่	วัคซีน	
1 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก)	0	DTP-HB-Hib1	0 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก)	DT1	ให้วัคซีน IPV เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ศึกษาอายุต่ำกว่า 7 ปี และเด็กภูมิต้านทานต่ำ
		OPV1		OPV1	
		IPV		IPV	
		MMR1		MMR	
2	1	DTP-HB-Hib2	1	HB1	ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับ เมื่อแรกเกิดและไม่มีผลเป็น ไม่ให้ฉีดติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของโรคเอดส์
		OPV2		LAJE1	
		LAJE1		LAJE1	
3	2	MMR2	2	OPV2	HB2
4	4	DTP-HB-Hib3	7	HB3	
6	12	DTP4	12	DT3	
		OPV4	OPV3		
		LAJE 2	LAJE 2		



กำหนดการให้วัคซีนในผู้ใหญ่

วัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการให้วัคซีน
dT	หญิงตั้งครรภ์	3 ครั้ง หรือตามประวัติการได้รับวัคซีน
	บุคคลอายุ 20, 30, 40, 50 (อายุคงท้ายด้วยเลข 0)	1 ครั้ง ทุก 10 ปี
Influenza	หญิงตั้งครรภ์ (สามารถรับวัคซีนได้ตลอดทั้งปี)	1 ครั้ง ทุกการตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป)
	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ปีละ 1 ครั้ง
	เฉพาะช่วงรุนแรง ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด และเบาหวาน 4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5. โรคขาดสติและมีผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 6. โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้	ปีละ 1 ครั้ง
MR	นักศึกษากิจการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1	1 ครั้ง
	เฉพาะช่วงรุนแรง ผู้ใหญ่อายุ 20 - 40 ปี ได้แก่ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน 2. บุคลากรทางทหาร/ตำรวจ 3. ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่กักขังได้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 4. กลุ่มวัยแรงงานในโรงงานและสถานประกอบการ 5. ประชาชนทั่วไป 6. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ แรงงานต่างด้าว ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ผู้ลี้ภัย เป็นต้น	1 ครั้ง
HB	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ให้ 3 ครั้ง (0, 1, 6 เดือน) ในผู้ที่เกิดก่อนปี 2536 ให้กระตุ้น 1 ครั้ง ในผู้ที่เกิดหลังปี 2536




หมายเหตุ

1. วัคซีนทุกชนิด ถ้าไม่ได้รับตามกำหนด สามารถให้ล่าช้าได้ทันทีเมื่อครบกำหนด
2. สำหรับวัคซีนที่ฉีดได้มากกว่า 1 ครั้ง จากเดิมมีการฉีดครั้งแรกเมื่อใดก็ตามที่มารับวัคซีนให้ฉีดตามครั้งต่อไปได้ โดยไม่ต้องเว้นระยะเว้น
3. กรณีพบเด็กที่รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนดหรือยังไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดให้ครบตามกำหนด ตามอายุครรภ์ระหว่าง 1 ปี จากเกณฑ์ให้ฉีดวัคซีนดังกล่าวแล้วมาพบบุคลากรทางการแพทย์
4. การบริการทางการแพทย์ เป็นไปตามระบบบริการสุขภาพที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่ศูนย์อนามัยแต่ละแห่ง





กำหนดการใช้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566



กำหนดการใช้วัคซีนในเด็ก

อายุ	วัคซีนที่ให้	ข้อควรระวัง
แรกเกิด	HB1 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี BCG วัคซีนป้องกันวัณโรค	ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง หลังคลอด ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
1 เดือน	HB2 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี	เฉพาะรายที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะ ของไวรัสตับอักเสบบี
2 เดือน	DTP-HB-Hib1 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ-ตับอักเสบบี-หัด OPV1 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน Rota1 วัคซีนโรต้า	ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งที่ 1 ในเด็กที่อายุมากกว่า 16 สัปดาห์
4 เดือน	DTP-HB-Hib2 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ-ตับอักเสบบี-หัด OPV2 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน IPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด Rota2 วัคซีนโรต้า	ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดรับประทาน 1 ครั้ง ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งที่สอง ในเด็กที่อายุมากกว่า 32 สัปดาห์
6 เดือน	DTP-HB-Hib3 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ-ตับอักเสบบี-หัด OPV3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน Rota3 วัคซีนโรต้า	ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งที่สอง ในเด็กที่อายุมากกว่า 32 สัปดาห์ ให้ยกเว้นการได้รับวัคซีนโรต้าครั้งที่ 3 ในเด็กที่ได้รับวัคซีน Rota1x มาแล้ว 2 ครั้ง
9 เดือน	MMR1 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน	
1 ปี	LAJE1 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจซี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	
1 ปี 6 เดือน	DTP4 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ OPV4 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน MMR2 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน	
2 ปี 6 เดือน	LAJE2 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจซี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	
4 ปี	DTP5 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ OPV5 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	
ประถมศึกษาปีที่ 1	MMR วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน	ตรวจหาแอนติบอดีและให้วัคซีน เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
	HB วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี	
	LAJE วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจซี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	
	IPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด	
ประถมศึกษาปีที่ 2	DT วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก	
	OPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน	
	BCG วัคซีนป้องกันวัณโรค	ให้ในกรณีที่ไม่มีการตรวจพบเชื้อวัณโรค เมื่อแรกเกิดและไม่มีการพบ มีโพแทสเซียมคลอไรด์หรือมีอาการ ของโรคแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนหญิง)	HPV1 และ HPV2 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี	ระหว่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน กรณีเด็กหญิงไทยที่อยู่ในระบบ การศึกษาให้ฉีดอายุ 11-12 ปี
ประถมศึกษาปีที่ 6	DT วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก	



กำหนดการใช้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า

ครั้งที่	ช่วงอายุ 1-6 ปี		ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป		ข้อควรระวัง
	เดือนที่	วัคซีน	เดือนที่	วัคซีน	
1 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก)	0	DTP-HB-Hib1	0 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก)	DT1	ให้วัคซีน IPV เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ในเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และเด็กที่มีแขนขา 1 ข้าง
		OPV1		OPV1	
		IPV		IPV	
		MMR1		MMR	
2	1	DTP-HB-Hib2	1	HB1	ให้ในกรณีที่ไม่มีการตรวจพบเชื้อวัณโรค เมื่อแรกเกิดและไม่มีการพบเชื้อวัณโรค ของโรคแล้ว
		OPV2		LAJE1	
		LAJE1		LAJE1	
3	2	MMR2	2	DT2	
				OPV2	
4	4	DTP-HB-Hib3	7	HB3	
		OPV3		OPV3	
5	12	DTP4	12	DT3	
		OPV4		OPV3	
		LAJE2		LAJE2	



กำหนดการใช้วัคซีนในผู้ใหญ่

วัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการใช้วัคซีน
dT	หญิงตั้งครรภ์	3 ครั้ง หรือตามประวัติก่อนได้รับวัคซีน
	บุคคลอายุ 20, 30, 40 ปี (อายุลงท้ายด้วยเลข 0)	1 ครั้ง ทุก 10 ปี
Influenza	หญิงตั้งครรภ์ (ตามการรับวัคซีนได้ตลอดทั้งปี)	1 ครั้ง ทุกครั้งที่ตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป)
	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เฉพาะช่วงระบาด ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่	ปีละ 1 ครั้ง
	1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการรักษาได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4. บุคคลที่มีอายุ > 65 ปีขึ้นไป 5. โรคไตเรื้อรังและมีผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 6. โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 36 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้	ปีละ 1 ครั้ง
	นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 เฉพาะช่วงระบาด ผู้ใหญ่อายุ 20 - 40 ปี ได้แก่	1 ครั้ง 1 ครั้ง
MR	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน	
	2. บุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจ 3. ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ชายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ 4. กลุ่มวัยแรงงานในโรงงานและสถานประกอบการ 5. ประชาชนทั่วไป 6. ประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ แรงงานต่างด้าว ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ผู้ลี้ภัย เป็นต้น	
HB	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ให้ 3 ครั้ง (0, 1, 6 เดือน) ในผู้ที่เกิดก่อนปี 2536 ให้กระตุ้น 1 ครั้ง ในผู้ที่เกิดหลังปี 2536



หมายเหตุ

1. วัคซีนชนิด DT ทั่วไปใช้ตามกำหนด 3 เข็ม อาจให้ฉีดเข็มที่ 2 ก่อนเข็มที่ 3
2. วัคซีนชนิด DT 1 เข็มแรกอาจให้ฉีดก่อนเข็มที่ 2 ได้ โดยไม่ต้องเว้นระยะ
3. กรณีพบเด็กที่มีประวัติป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ หรือมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดได้ทันทีตามกำหนด ภายใต้ระยะเวลา 1 ปี จากวันที่ฉีดเข็มแรก
4. การรับวัคซีนลดการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สามารถทำได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

